

## КОМБИКОРМ ДЛЯ ИНДЕЕК

Полнорационные сбалансированные гранулированные комбикорма для ИНДЕЕК, произведенные ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» полностью обеспечивают:

- Правильное питание, быстрый рост и развитие птицы
- Оптимальную конверсию на весь период выращивания
- Высокую сохранность индеек
- Высокое качество мяса

### Схема кормления индеек:

| Наименование                            | ПК 11   | ПК 12                    | ПК 10                 |
|---|---|--------------------------|-----------------------|
| Вид комбикорма                          | Крупка  | Гранула 3,2 мм           | Гранула 3,2 мм        |
| Возраст птицы                           | От 1 до 8 недель  | От 9 недель до 17 недель | От 18 недель и старше |
| Расход корма на голову в сутки          | 20-200 грамм  | 200-350 грамм            | 350-850 грамм         |
| Расход корма за весь период выращивания | Средний срок откорма индеек 30 недель до живой массы 17-20 кг.<br>Общее потребление корма за весь период выращивания 45,0-47,0 кг |                          |                       |

Комбикорма для ИНДЕЕК идеально сбалансированы для раскрытия генетического потенциала птицы и получения вкусного мяса высокого качества в короткие сроки. Выращивать индейку на полнорационных комбикормах ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» экономически выгодно.

Комбикорм скармливают индейкам в сухом виде. Комбикорм нельзя заливать кипятком или варить, так как в нем содержатся питательные ингредиенты, полностью теряющие свои полезные свойства от высоких температур, например ферменты, витамины и минералы. При необходимости можно смочить комбикорм водой не горячее 30-50 °С.

При выращивании индейки важно обеспечить птице свободный доступ к свежей питьевой воде. Особое внимание обратите на качество воды для поения индейки. В первые сутки для улучшения пищеварения можно добавить в кипяченую воду сахар (около 1 ст.л на 1л воды). Не поите индейку слишком холодной или слишком теплой водой. Идеальная температура воды для индейки 10-15 °С.

Также, для отличного пищеварения у индеек в неограниченном количестве и свободном доступе всегда должна быть ракушка молотая или известняковая крупка.

Мойте кормушки и поилки горячей водой, регулярно проводите дезинфекцию в птичнике. Контролируйте вентиляцию и влажность в нем.

### Оптимальный температурный режим при содержании индеек:

| Возраст индюшат, дней | Температура воздуха под лампой, °С | Длительность светового дня, часов |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1-7 дней              | 30-35 °С                           | 24 часа                           |
| 8-28 дней             | 25-29 °С                           | 17 часов                          |
| 29-40 дней            | 22-24 °С                           | 14 часов                          |
| старше 40 дней        | 18-19 °С                           | 8-12 часов                        |

### Состав комбикормов для индеек:

пшеница, кукуруза, шрот соевый, шрот подсолнечный, мука рыбная, мука мясная, дрожжи кормовые, масло подсолнечное, монокальцийфосфат, мука известняковая, аминокислоты, соль поваренная, витамины, минералы, ферменты, антиоксидант, кокцидиостатик (ПК-11) и другие ингредиенты.

### Основные качественные показатели комбикормов для индеек:

| Наименование  | Единицы измерения | ПК 11   | ПК 12   | ПК 10    |
|---|-------------------|---------|---------|----------|
| Обменная энергия птицы                                | ккал/100г         | 301,00  | 285,00  | 290,00   |
| Сырой протеин   | %                 | 25,00   | 18,00   | 17,20    |
| Сырой жир   | %                 | 3,40    | 4,20    | 4,2      |
| Сырая клетчатка                                       | %                 | 3,30    | 5,20    | 5,00     |
| Лизин   | %                 | 1,60    | 1,00    | 1,00     |
| Метионин  | %                 | 0,60    | 0,40    | 0,40     |
| Метионин+цистин                                       | %                 | 1,0     | 0,70    | 0,70     |
| Са  | %                 | 1,7     | 2,00    | 2,00     |
| Р усвояемый   | %                 | 0,6     | 0,50    | 0,50     |
| Na  | %                 | 0,4     | 0,40    | 0,40     |
| Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее |                   |         |         |          |
| Витамин А   | Тыс.МЕ            | 12,00   | 8,00    | 12,00    |
| Витамин Д3  | Тыс.МЕ            | 4,00    | 2,00    | 5,00     |
| Витамин Е   | мг                | 100,00  | 70,00   | 30,00    |
| Витамин К3  | мг                | 1,00    | 1,00    | 5,00     |
| Витамин В1  | мг                | 1,00    | 1,00    | 2,50     |
| Витамин В4  | мг                | 1010,00 | 1010,00 | 1 028,00 |
| Витамин В6  | мг                | 2,00    | 2,00    | 5,00     |
| Витамин В12   | мг                | 0,02    | 0,02    | 0,03     |
| Fe  | мг                | 25,00   | 25,00   | 30,00    |
| Cu  | мг                | 5,00    | 5,00    | 8,00     |
| Zn  | мг                | 60,00   | 60,00   | 80,00    |
| Mn  | мг                | 70,00   | 70,00   | 100,00   |
| Se  | мг                | 0,20    | 0,2     | 0,30     |

**Срок хранения: 3 месяца**